

Alergia severa Plan de Acción



Place
Child's
Picture
Here

Nombre del Estudiante _____ Fecha de Nacimiento _____ Idioma natal _____

Maestro _____ VER SALA DE ENFERMERÍA PARA LISTA DE PERSONAL ENTRENADO

Asmático Sí* No *Riesgo mayor de reacción grave Fecha de la última reacción: _____

ALERGIA A: _____

Si se ha ingerido un alimento al que es alérgico, pero no hay síntomas, busque la presencia de síntomas

PASO 1: TRATAMIENTO

Entregue el medicamento revisada	
Síntomas	(Será determinado por el médico que autoriza los medicamentos)
• Picazón, hormigueo en la boca o hinchazón de labios, lengua, boca	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Urticaria, sarpullido con comezón, hinchazón del rostro o extremidades	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Nausea intestinal, calambres abdominales, vómitos, diarrea	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Garganta †Opresión en la garganta, ronquera, tos seca	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Pulmón † Falta de aliento, tos persistente, sibilancia	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Corazón † débil, pulso, baja presión arterial, desmayo, palidez, color azulado	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Sensación inminente de fatalidad, desorientación	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico
• Si la reacción está progresando (varias de las áreas afectadas anteriores) suministre:	<input type="checkbox"/> epinefrina <input type="checkbox"/> antihistamínico

† Potencialmente mortal La gravedad de los síntomas puede cambiar rápidamente.

Medicaciones/indicaciones del médico

Epinefrina: inyectar por vía intramuscular _____ Med/dosis

Antihistamínico: suministrar por vía oral _____ Med/dosis

Otras indicaciones del médico: _____

IMPORTANTE: NO SE PUEDE DEPENDER DEL INHALADOR PARA EL ASMA Y/O ANTIHISTAMÍNICOS PARA SUSTITUIR LA EPINEFRINA EN LA ANAFILAXIS.

PASO 2: LLAMADAS DE EMERGENCIA

1. Llamar al 911 o a la brigada de rescate: _____ . Señale que se ha tratado una reacción alérgica y que se puede necesitar epinefrina adicional. <input type="checkbox"/>
2. El Dr. _____ al _____ medicamento/dosis/por vía
3. Contactos de emergencia: Nombre/Relación Número(s) telefónico(s)
1. _____ 1) _____ 2) _____
2. _____ 1) _____ 2) _____
3. _____ 1) _____ 2) _____

INCLUSO SI NO SE PUEDE CONTACTAR A UNO DE LOS PADRES/TUTOR, NO DUDE EN MEDICAR O LLEVAR EL NIÑO AL CENTRO MÉDICO. Consentimiento de auto-administración (siempre que la enfermera de la escuela determine que es seguro – se requiere formulario adicional)

Firma de uno de los padres/tutor _____ Fecha _____

Firma del médico _____ Fecha _____

Alergia severa

Plan de Acción

Place
Child's
Picture
Here

EPIPEN Y EPIPEN JR. INSTRUCCIONES:

Paso 1,

Quite el auto-inyector del tubo transportador.

Precauciones:

Nunca coloque el dedo pulgar, los demás dedos o la mano sobre la punta naranja. Nunca presione ni empuje la punta naranja con el pulgar, dedos o mano. La aguja sale de la punta naranja.

No quite el seguro azul hasta que esté listo para usarse.

No lo utilice si la solución ha perdido color.

paso 2,

Elija la unidad del tamaño correcto:

Auto-inyector EpiPen de 0,3 ml para pacientes que pesan más de 66 libras o 30 kg (caja amarilla) o

EpiPen Jr. 0,15 ml para pacientes de 33 a 66 libras (15-30 kg) (caja verde)

Agarre la unidad con la punta naranja mirando hacia abajo. Forme un puño alrededor de la unidad.

Con su otra mano, tire del seguro azul.

paso 3,

Sostenga la punta naranja cerca del muslo exterior. Oscile y empuje firmemente la punta naranja contra el muslo exterior para que haga clic. Sostenga con el muslo durante unos 10 segundos para suministrar el fármaco.

La ventana en el auto-inyector se oscurecerá. La unidad está diseñada para trabajar a través de la ropa, si hace falta.

La mayor parte del líquido (aproximadamente 85%) permanece en el auto-inyector y no se puede utilizar de nuevo. El paciente ha recibido la dosis correcta de medicamento si la punta naranja de la aguja se extiende y la ventana se oscurece.

paso 4

Quite la unidad del muslo (la cubierta de la aguja naranja se extenderá para cubrir la aguja) y el área de inyección para masaje durante unos 10 segundos.

No inyecte en las nalgas ni lo suministre por vía intravenosa.

Supervise al paciente de cerca y prepárese para llamar al 911 para una atención médica inmediata si hace falta.

Deseche la unidad utilizada en un recipiente para residuos biológicos.